



SADECE HAYVAN SAĞLIĞINDA KULLANILIR.



Ekozanid 1125

Oral Tablet
Veteriner Anthelmintik

BİLEŞİMİ

Ekozanid 1125 Oral Tablet, kırılı beyaz renkli ve ortasından çentikli bolus şeklinde olup, her tablet 375 mg Oksfendazol ve 750 mg Oksiklozanid içerir.

FARMAKOLOJİK BİLGİ

Ekozanid 1125 bileşiminde bulunan Oksfendazol bir benzimidazol türevidir. Oksfendazol, parazit helmintlerin enerji-üretim metabolizmasını bozarak suretiyle anthelmintik etki gösterir. Parazitlerde fumarat reduktazın etkinliğini engelleyerek etkili olur. Engelleme sonucu glikoz emilmesini önler, glikojen kullanımını artırır ve ATP üretimini azaltır. Bunun sonucunda kullanılabilir enerjiden yoksun kalan parazit ölür. Oksfendazol yavaş bir şekilde metabolize olarak vücuttan atılır. Aktif madde ve metabolitlerin vücuttan atılmaları yavaştır. %26 oranında idrarla, %63 oranında gaita ile atılır.

Oksiklozanid, Salisilanid türevi suda çözünmeyen bir ilaçtır. F.hepatica ve F.gigantica'nın ergin şekillerinde etkilidir. Oksiklozanid, parazitlerde oksidatif fosforilasyonun kınılması sonucunda enerji metabolizmasını bozarak etkir. Oksiklozanid sağır ve koyunların sindirim kanallından iyi emilir ve 24-48 saat içinde plazmada doruk yoğunluğunda erişir. Sindirim kanalı, karaciğer ve böbreklerde en yüksek yoğunluklarda birikir. Büyük ölçüde idrarla ve glukuronid bileşiği şeklinde atılır.

ENDİKASYONLARI

Ekozanid 1125, sağır ve koyunlarda mide-bağırsak ve akciğer kurtları, şeritler ve karaciğer kelebekleri üzerinde etkilidir.

Etkili Olduğu Parazitler:

Karaciğer Kelebekleri: Fasciola hepatica ve Fasciola gigantica'nın ergin şekilleri ve yumurtaları

Mide bağırsak kurtları: Trichostrongylus sp., Ostertagia sp., Haemonchus sp., Nematodirus sp., Cooperia sp. ve Bunostomum sp. **Trichuris ve Oesophagostomum türleri:** Chabertia ovina'nın olgun ve gelişmekte olan genç formları ile yumurtaları. **Akciğer kurtları:** Dictyocaulus viviparus ve Dictyocaulus filaria **Şeritler:** Moniezia sp.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Veteriner hekim tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde farmakolojik dozlar;

Koyun : 5-7,5 mg/kg canlı ağırlık oksfendazol, 15-20 mg/kg canlı

ağırlık oksiklozanid

Sağır : 5 mg/kg canlı ağırlık oksfendazol, 10-15 mg/kg canlı

ağırlık oksiklozanid şeklindedir.

Hayvan Türü	Pratik Doz
Kuzu	1/2 tablet (25 kg canlı ağırlığa kadar)
Koyun	1 tablet (50 kg canlı ağırlığa kadar)
Buzağılar	2 tablet (100 kg canlı ağırlığa kadar)
Danalar	3 tablet (150 kg canlı ağırlığa kadar)
Şağır	4 tablet (200 kg canlı ağırlığa kadar)

Tabletler yuturulur ya da su içinde dağıtılarak şöyle içirilir.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR
Etkili bir mücadele için iç parazit ilaçlarının aşağıda belirtilen program dahilinde kullanılmasını tavsiye edilmektedir:

- Biri ilkbahar ve diğeri sonbaharda olmak üzere yılda en az 2 ilaçlama,
- Meraların parazitlerle bulaşmasını önlemek için meraya çıkmadan önce bir uygulama,
- Kuzuların korunması bakımından doğum sonrası bir uygulama,
- Oviseal etkinin tamamlanması ve mera bulaşıklığının önlenmesi bakımından tedavi edilen hayvanların 12 saat kapalı tutulmaları tavsiye edilir.



SADECE HAYVAN SAĞLIĞINDA KULLANILIR.



İSTENMEYEN ETKİLER

Hafif nefes darlığı, hipotansiyon, defekasyon, ürinsiyon gibi yan etkiler geçici olup bir-iki saat içinde kaybolur.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Oksfendazol'un, trematodlara karşı bromsalanlarla birlikte kullanılmaması önerilir. Bromsalanlarla birlikte kullanıldığında sağırda abortlara ve koyunlarda da ölümlere neden olabilirler.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDÖT

Oksiklozanid koyunlara 60 mg/kg ve üzeri dozlarda uygulandığında ölüm gelişebilir. Sağırda ise 30 mg/kg doza uygulandığında bazı zehirlenme belirtileri ortaya çıkabilir.

Terapötik endeksinin çok üzerinde yüksek dozlarda verildiğinde, iştahsızlık, depresyon, ataksia, yere yatma ve ayağa kalkamama, solunum hızlanması, salya artışı, spazm gibi toksik belirtiler ortaya çıkabilir, bazen ölüm olabilir. Bu durumda klinik semptomlara göre sağırma geçilmelidir.

GİDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI

İLAÇ KALINTI ARINMA SÜRESİ (İ.K.A.S.): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra, etki için yetiştirilen sağır 28 gün, koyunlar 21 gün süreyle kesime sevk edilmemelidir, ineklerden elde edilen süt 5 gün (10 sağımlı) süresince insan tüketimine sunulmamalıdır. İnsan tüketimi için süt elde edilen koyunlara uygulanmaz.

KONTRENDİKASYONLARI

Aşırı karaciğer yetersizliği olan hayvanlarda kullanılması tavsiye edilmez. **Gebelikte kullanım:** Benzimidazol grubu anthelmintiklerin embriyotoksik ve teratojenik etkilerinden dolayı koç katımı sırasında ve gebeliğin ilk 1/3'ünde bulunan hayvanlarda kullanılması kontrendikedir.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerde ve gıdalardan uzakta bulundurunuz.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ:

Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 3 yıldır. Serin ve direkt güneş ışığından koruyarak, oda sıcaklığında (15-25 °C'de) saklayınız.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

Karton kutu içerisinde 10 tabletlik blister ambalajlarda satışa sunulmuştur.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI

Veteriner hekim reçetesi ile eczane ve veteriner hekim muayenehanelerinde satılır (VHR).

PROSPEKTÜS ONAY TARİHİ: 29.12.2016

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

PAZARLAMA İZİN TARİHİ VE NO: 17.05.2007-18/040

PAZARLAMA İZİN SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ:

Ekomed İlaç A.Ş.

Şerifali Mahallesi Turcan Caddesi Münevver Sokak No: 10 Kat: 3

34775 Ümraniye / İstanbul

www.ekomedilac.com

ÜRETİM YERİNİN ADI VE ADRESİ:

Arion İlaç San. ve Tic. A.Ş.

İTOB (İstanbul Tuzla Organize Sanayi Bölgesi) 12. Cad. No: 8

34959 Tepeören - Tuzla / İstanbul