



SADECE HAYVAN SAĞLIĞINDA KULLANILIR.



Ekozanid

Oral Tablet
Veteriner Anthelmintik

BİLEŞİMİ:

Ekozanid Oral Tablet krem renkli ve ortasından çentikli bolus şeklinde olup, her tablet 300 mg Oksfendazol ve 600 mg Oksiklozanid içerir.

FARMAKOLOJİK BİLGİ:

Ekozanid Oral Tablet oksiklozanid ve oksfendazol etken maddelerinin kombinasyonundan oluşmuş geniş spektrumlu bir antihelmintiktir.

Bir salisilanid türevi olan oksiklozanid trematodlardan F.hepatica ve F.gigantica erginlerine karşı etkilidir. Parazitler üzerine etkisi tam olarak bilinmemekle birlikte oksidatif fosforilasyonu engelleyip, yoğun enerji açığı şekillendirerek parazitlerin ölümüne yol açtığı düşünülmektedir. Ağız parçılarının genç şekilleri için sağaltım dozunun üç katı etkili olmaktadır. Oksiklozanid ruminantlara oral yolla verildiğinde sindirim kanalında iyi emilir. Karaciğer, böbrek ve barsaklarda yoğun olarak bulunur ve glukuronid bileşiği halinde safıyla atılmaktadır. Pik plazma yoğunluğuna yaklaşık 45 saat sonra ulaşır.

Benzimidazol bileşiği olan oksfendazol ise antinematodal ve antisestodal etkililiğe sahiptir. Etkisini parazitlerde fumaratın süksinata indirgenmesine aracılık eden fumarat redüktaz'ın etkinliğini engelleyerek enerji oluşumunu önler ve parazitlerde kasların felcine, bunun sonucunda parazitlerin ölümüne yol açarak gösterir. Oksfendazol suda az çözünüp sindirim kanalından sınırlı şekilde emilir. 5 mg/kg doza ağız yoluyla verildiğinde 6 saatte plazmada 1,25-3µg/ml'lik doruk noktaya erişir. Vücuttan atılımı büyük oranda dışkı ile olur. T.colubriformis, Ostertagia sp. ve Haemonchus türlerinde benzimidazol grubuna bağlı bileşiklere karşı direnç şekillenebilir.

ENDİKASYONLARI:

Ekozanid Oral Tablet koyun ve sığırlarda mide, bağırsak ve akciğer kılkırtıların ergin, larva ve yumurtalarının, karaciğer kelebeklerinin erginlerinin ve Moniezia sp. erginlerinin tedavisi ve enfeksiyonlarından korunmada kullanılır.

Karaciğer kelebekleri: Fasciola hepatica ve Fasciola gigantica (ergin)

Mide barsak kılkırtıları: Mide: Haemonchus sp., Ostertagia sp., Trichostrongylus axei

İnce bağırsak: T.colubriformis, Trichostrongylus sp., Nematodirus sp., Cooperia sp., Bunostomum sp., Gaigeria pachyscelis

Kalın bağırsak: Chabertia ovina, Oesophagostomum sp., Trichuris sp.

Akciğer kılkırtıları: Dictyocaulus sp.

Barsak şeritleri: Moniezia sp.

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU:

Veteriner Hekim tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde farmakolojik dozlar;

Koyun: 5-7,5 mg/kg canlı ağırlık oksfendazol, 15-20 mg/kg canlı ağırlık oksiklozanid.

Sığır: 5 mg/kg canlı ağırlık oksfendazol, 10-15 mg/kg canlı ağırlık oksiklozanid şeklinde olup, pratik dozu;

Kuzu (20 kg) : Yarım oral tablet

Koyun (40 kg) : 1 oral tablet

Danalar (100-200 kg) : 2-3 oral tablet

Sığırlara (200-300 kg) : 3-4 oral tablet şeklindedir.

Ekozanid Oral Tablet hayvanlara ya doğrudan doğruya yutturulur ya da su içinde eritilerek içirmek suretiyle verilir. Ürün ortasındaki çentikten kırılarak yarım oral tablet halinde de kullanılabilir.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN UYARILAR:

Etkili bir mücadele için iç parazit ilaçlarının aşağıda belirtilen program dahilinde kullanılması tavsiye edilmektedir:

- Biri İkibahar ve diğeri sonbaharda olmak üzere yılda en az 2 ilaçlama,
- Meraların parazitlerle bulaşmasını önlemek için meraya çıkmadan önce bir uygulama,



SADECE HAYVAN SAĞLIĞINDA KULLANILIR.



- Kuzuların korunması bakımından doğum sonrası bir uygulama,
- Ovisidal etkinin tamamlanması ve mera buluşukluğunun önlenmesi bakımından tedavi edilen hayvanların 8 - 12 saat kapalı tutulmaları tavsiye edilir.

İSTENMEYEN ETKİLER:

Sığır ve koyunlarda Oksiklozanid'in tolerans verileri, tek seferde uygulanan nispeten düşük dozların (15 mg/kg canlı ağırlık) merkezi sinir sistemi ve bağırsak fonksiyonları üzerinde istenmeyen etkiler (davranış bozukluğu, diyare ve iştahsızlık) oluşturabileceğini göstermiştir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ:

Bromsalan bileşikleri (dibromsalan ve tribromsalan'ın eşit miktardaki karışımından olan hilomid gibi) birlikte kullanıldığında ineklerde abort ve koyunlarda ölümüne neden olabileceğinden, bu ilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI:

İlaç kalıntı arınma süresi (İ.K.A.S.): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra etli için yetiştirilen sığırlar 28 gün, koyunlar 21 gün süreyle kesime sevk edilmemelidir. Sığırlarda tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 5 gün (10 sağımlı) süreyle elde edilen süt insan tüketimine sunulmamalıdır. İnsan tüketimi için süt elde edilen koyunlarda kullanılmaz.

KONTRENDİKASYONLARI:

Karaciğer yetersizliği olan hayvanlarda tavsiye edilmez.

Gebelikte kullanımları: Benzimidazol grubu antihelmintiklerin embriyotoksik ve teratojenik etkilerinden dolayı koç katımı sırasında ve gebeliğin ilk 1/3'ünde bulunan hayvanlarda kullanılmaması kontrendikedir.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER:

Oksiklozanid sığır ve koyunlarda yüksek dozlarda verildiği takdirde toksisite belirtilerinin şiddeti artırmakta (terapötik endeksinin çok üzerinde yüksek dozlarda verildiğinde, iştahsızlık, depresyon, ataksia, yere yatma ve ayağa kalkamama, solunum hızlanması, salya artışı, spazm gibi toksik

belirtiler ortaya çıkabilir) ve 50 mg/kg canlı ağırlık ve üzeri dozlarda ölüm şekillenebilmektedir. Toksik belirtiler durumunda klinik semptomlara göre sağıtma gereklidir.

GENEL UYARILAR:

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerde ve gıdalardan uzakta bulundurunuz.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ:

Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 3 yıldır. Serin ve direkt güneş ışıltısından koruyarak, oda sıcaklığında (15-25 °C'de) saklayınız.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ:

Karton kutu içinde 10 tabletlik blister ambalajlarda satışa sunulmuştur.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI:

Veteriner hekim reçetesi ile veteriner muayenahanelerinde ve eczanelerde satılır (VHR).

PROSPEKTÜS ONAY TARİHİ: 08.11.2010

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZİN TARİHİ VE NO:
11.09.2006-16/084

PAZARLAMA İZNİ SAHİBİ VE ADRESİ

Ekomed İlaç Lojistik ve Turizm San. Tic. A. Ş. Şerifali Mah. Turcan Cad. Münvever Sok. No: 10 Kat:3 Ümraniye/İstanbul

ÜRETİM YERİ VE ADRESİ

Arion İlaç San. ve Tic. A.Ş. İstanbul Tuzla Organize Sanayi Bölgesi (İTOSB) 12. Cad. No:8 Tepeören-Tuzla/İstanbul