



SADECE HAYVAN SAĞLIĞINDA KULLANILIR.



ZEHIRLİDİR

Dökme Çözelti
Veteriner Ektoparazitler

Rumimetrin

BİLEŞİMİ

Rumimetrin dökme çözelti, Berrak, sarıdan kırmızımsı kahverengiye kadar değişen renkte, partikülsüz homojen, kendine özgül kokulu sıvı olup, her ml'si 10 mg flumetrin ve antioksidan olarak 3 mg BHT içermektedir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

Farmakodinamik özellikler

Flumetrin tip II sentetik piretroid olup, bu grubun diğer üyeleri gibi bazı bitkilerden elde edilen piretrinlerden elde edilmektedir. Piretroidler repellent etki yanında kontakt insektisit ve akarisit etkiye sahiptir. Etki bölgesi, sinir hücrelerinde bulunan voltaj bağımlı sodyum kanallarıdır. Flumetrin bu kanalların uzun süreli açık kalmasına neden olur. Bu durum artropodlarda başlangıçta uyanmaya ve koordinasyon bozukluğuna neden olur, daha sonra yeterli süre sonunda felç ve ölüm gerçekleşir. Aynı zamanda dişi kenelerin yumurta üretimini inhibe eder, yumurtalardan canlı larva oluşum oranını azaltır. Flumetrinin akut toksisitesi kullanılan çözeltiye göre değişiklik gösterir. Ratlar için oral LD50 değeri 41-3849 mg / kg vücut ağırlığıdır.

Kronik toksisite çalışmalarında ratlar için Ratlardaki NOEL değeri 0,7-0,8 mg/kg vücut ağırlığı (günlük-oral) ve köpeklerdeki NOEL değeri 0,88 mg/kg vücut ağırlığı (günlük-oral) olarak bulunmuştur.

Siğirilerde topikal uygulamada toleransı iyidir.

Siçanlar ve tavşanlar üzerinde yürütülen üreme toksisitesi çalışmaları, maternal toksite için sırasıyla günde 0,5 mg/kg ve 1,7 mg/kg vücut ağırlığı NOEL değeri, fetal toksisite için günde 1,0 ve 1,7 mg/kg vücut ağırlığı NOEL değeri bulunmuştur.

Flumetrin genotoksik ve karsinojenik olmayan bir madde olarak sınıflandırılmıştır.

Farmakokinetik özellikler

Deriye uygulandıktan sonra yüzeyden hızla emilir, 1-4 saat sonra vücudun diğer bölümlerine dağılır. Plazma ve süt düzeyleri çok düşüktür. Dokularda birikim uygulamaya bölgesi hariç azdır. Uygulama dozunun %70 i uygulamaya bölgesinde %30'u deri tarafından emilir. Ester hidrolizis yolu ile metabolize edilerek ürün ve safra yolu ile atılır.

KULLANIM SAHASI/ENDİKASYONLAR

Aşağıdaki parazitlerden kaynaklanan enfestasyonların önlenmesi ve tedavisi için;

- Keneler (*Ixodes, Amblyomma sp., Dermacentor, Boophilus sp., Hyalomma sp., Haemaphysalis ve Rhipicephalus*)
- Bitter (*Linognathus vituli, Haematopinus eurytismus, Bovicola bovis*)
- Uyuş (*Chorioptes bovis, Sarcoptes bovis, Psoroptes ovis*)



SADECE HAYVAN SAĞLIĞINDA KULLANILIR.



İSTENMEYEN ETKİLER

Diğer piretroidler gibi nadiren hayvanlarda endişe/telaş haline neden olabilir, çok nadir olarak geçici ishal görülebilir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Organik fosforlu bileşikler piretroidlerin toksisitesini artırır. Bu nedenle bu grup ilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır.

Diğer harici ektoparazitler ürünlerle birlikte kullanılmayın.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT

Siğirilerde 10 mg/kg doza kadar uygulama iyi tolere edilir. Yine de tavsiye dozu aşılmalıdır. 20 mg/kg üzeri dozlar deride irritasyona neden olur. Bazı hayvanlarda geçici kırmızılık ve geçici ishal görülebilir. Diğer piretroidler gibi aşırı doz uygulamaları kuyruk sallama, sağın bölgesini yalama gibi davranışları tetikleyebilir. Hayvanların ürünü yutması halinde derhal veteriner hekime bilgi veriniz. Spesifik bir antidotu yoktur. Zehirlenmelerde semptomatik tedavi uygulanmalıdır.

GIDA DEĞERİ OLAN HAYVANLARDA KALINTI UYARILARI

Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra siğirler 5 gün, koyunlar 21 gün geçmeden kesime gönderilmemeli, son ilaç uygulamasından sonra 8 gün (16 sağımlı) geçmeden elde edilen inek sütleri insan tüketimine sunulmamalıdır. İnsan tüketimi için süt elde edilen koyunlara uygulanmaz.

KONTRENDİKASYONLAR

Ürünün bileşiminde bulunan maddelere duyarlı hayvanlarda kullanılmaz.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerde ve gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN ÖNERİLER

Bu ürün insanlarda aşırı duyarlılığa ve göz veya deride irritasyona neden olabilir. Uygulama sırasında ürünü ve yeni ürün uygulanmış hayvanla veya uygulama ekipmanı ile direkt göz veya deri temasından kaçınınız.

Kullanıcılar ürünü uygulama sırasında su geçirmez nitril eldiven ve bot kullanmalıdır. Kullanılan koruyucu ekipman kullanımdan sonra iyice yıkanmalıdır. Kullanımdan sonra el ve yüz sabun ve su ile yıkanmalıdır. Kaza deri veya muköz membranla temas halinde temas bölgesini acilen sabun ve su ile yıkayınız. Göze temas halinde gözü bol su ile yıkayınız ve tıbbi öneri alınır.

Uygulama sırasında hiç bir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara vb. ürün kullanmayınız.

Bu ürün sadece hayvanlarda harici kullanım içindir ve insan ve hayvanlarda ağız yoluyla alınmamalıdır.

Yiyecek ve içeceklerden uzak muhafaza ediniz.

Kazara ağız yolu ile alınırsa kusarak ilacı atmaya çalışın ve acilen doktora başvurun.

Parestesi (uyuşukluk/karıncalanma), aşırı tükürük, titreme ve kasılma bu ürünle zehirlenme belirtileridir.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Orijinal ambalajı içinde, dondurulmadan ve buzdolabına konulmadan 25°C'nin altında saklanmalıdır. Güneş ışığından koruyunuz. Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 24 aydır. Açıldıktan sonra 9 ay içinde kullanılmıdır. Açıldıktan sonra bitmiş ürün saklama koşulları ile aynı olacak şekilde saklayınız.

KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR

Kullanılmış ürün ambalajları, kullanılmamış veya arta kalan ürün ilgili mevzuata göre imha edilmeli, imha edilene kadar bu materyaller kolay erişilemeyecek şekilde muhafaza edilmeli, kirli su/lağım sularına karışmaması sağlanmalıdır. Boş ambalajlar tekrar kullanılmaz. BU ÜRÜN BALIK, SU CANILARI VE ARILAR İÇİN ZEHIRLİDİR.

TİCARİ TAKDİM ŞEKİLLERİ

Alüminyum folyolu PP beyaz kapaklı 100 ml ve 500 ml'lik beyaz renkli ve ölçekli HDPE plastik şişeler, karton kutu içerisinde sunulmaktadır.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI

Veteriner hekim reçetesi ile eczanelerde, veteriner hekim muayenehane, polikliniklerinde ve hayvan hastanelerinde satılır (VHR).

PROSPEKTÜSÜN ÖNAY TARİHİ: 25.02.2026

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİHİ VE NO:
08.03.2021 - 029/0074

PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ

Ekomed İlaç Lojistik ve Turizm San Tic. A. Ş.

Şerifali Mah. Turcan Cad. Münevver Sok. No: 10 Kat: 3 Ümraniye / İstanbul

ÜRETİCİ FİRMA VE ADRESİ

Farmatek Tarım Sanayi Müm. ve Tic. A.Ş.

Aydınlı-KOSB Mah. Tuzla Kinyas San. Analitik Cadde No: 90 Tuzla / İstanbul